

## Vier neue Cicindeliden-Species.

Beschrieben von

Dr. med. *Walther Horn*.

Die vier folgenden neuen Arten verdanke ich der außerordentlichen Liebenswürdigkeit des Lord Dormer, welcher sie mir — gelegentlich der Besichtigung seiner schönen Sammlung — zu dediciren die Güte hatte, obwohl drei derselben Unica waren. An dieser Stelle statte ich noch einmal meinen verbindlichsten Dank ab!

*Ctenostoma (Procephalus) Dormeri* n. sp.

*Procephalo metallico* Lap. *huiusque subspeciebus affine, differt labro lateraliter multo brevior, in medio (longe producto) acute tridentato (dente centrali longiore quam sequente), ante angulum lateralem unidentato; fronte sulco quadrato centrali (sulcis 2 juxta-orbitalibus et antice et postice sulco distincto conjunctis); ut pars quadrata sat convexa glaberrima in media fronte formetur, ornata; thorace brevior, parte media multo globosior quam in unaquaque illarum varietatum; elytris paullo rarius (sed non subtilius!) quam in Ct. metallico* Cast. *punctatis (saepius et grossius quam in subsp. nigra Chd.), macula lutea S-formi (elytro sinistro!) nec marginem nec suturam attingente pone medium ornatis: parte antica (suturali) fere in medio transversali, (marginali) postica oblique ascendente, intermedia longitudinali tenui. Colore piceo-nigro fere ut in subsp. nigra Chd., sed pedibus paullulum brunnescentibus. — Long. 15½ mill. (sine labro).*

1 ♂. Brasilia.

Kopf und Halssch. zusammen machen einen etwas zierlicheren Eindruck als bei jenen vier Formen. Thorax im mittleren Abschnitt erheblich kugelig. Die fast längs gestellte gelbe Binde ist recht auffallend: der hintere, wieder schräg aufsteigende (kurze) Ast ist etwas größer als der obere horizontale. Auf der ganzen hinteren Fld.-Hälfte sieht man nur in der Nähe der Naht einige Punkte. Die beiden lateralen Zähne der O.-Lippe bleiben weit von den drei centralen getrennt.

*Collyris Dormeri*.

(Coll. *caviceps* Chd. ex parte, nec Klg.)

*Differt a C. Mniszechi* Chd. ♂ *capite minore, postica verticali verticis parte paullo altiore; thorace valde angustiore, ante medium*

*minus convexo, superficie densius profundiusque striolata; elytris pone medium vix rarius minusque dense punctatis, in medio plicis 7—8 longis transversis (a margine late remotis, sed suturam fere omnibus attingentibus) ornatis. Tibiis tarsisque anticis et intermediis totis nigro-cyanescentibus. — Long. 23 mill.*

1 ♂. Ind. or.

Die einzige hohlköpfige *Collyris* mit stark prononcirter Querrunzelung in der Mitte der Fld. (bei *C. Mniszechi* Chd. variirt übrigens die Skulptur nicht unerheblich). Zweites und drittes Glied der Kiefertaster vorn gelblich, erstes der Lippentaster gelb (der Rest ist abgebrochen).

Chaudoir hat unter dem Namen *C. caviceps* Klg. zwei Arten zusammengeworfen, die nichts mit einander zu thun haben. Die „in litteris“ *C. grandis* Hope genannte Art, deren Typus ich neulich in Oxford sah — ich glaube mich nicht zu irren — dürfte identisch sein mit meiner neuen Species. Die Etiquette von Chaudoir's Hand lautete: *caviceps* Klg. = *longicollis* H. = *grandis* Hope! Der Typus von *C. caviceps* Klg. (Mus. Berol.) ist ein kleines ♂, das in allem mit meinem ♀ von *C. longicollis* F. übereinstimmt, nur sind O.-Lippe (mit Ausnahme der Spitze der Zähne), alle Tasterglieder und Fühler (erstes Glied an der Basis cyanfarben) hellgelb. Die hintere steile Partie des Vertex ist etwas weniger hoch (schwankt bei den verwandten Arten nach den Geschlechtern und vielleicht auch Exemplaren!). Leider habe ich im Augenblick kein sicheres ♂ von *C. longicollis* F. und muß es daher unentschieden lassen, ob *C. caviceps* Klg. — wie ich vermuthe — das ♂ von der Fabricius'schen Art ist.

#### *Therates Dormeri.*

*Differt a Ther. Hennigi m. statura paullo majore robustioreque, labro toto pallide-flavo, mediis antennarum articulis cyaneo-nigris; thorace in medio latiore valdeque globosiore; elytris non subtilius sed paullo rarius sculptis, ante apicem fere glabris, totis violaceo-purpurascenscentibus: fascia angusta transversa (marginem et suturam fere attingente) et tertia parte basali (macula parva rotundata pone basim in medio disco collocata lineaque angusta suturali exceptis metallicis!) juxta suturam paullulum longius apicem versus quam post humeros flavis, summo apice albescente. — Long. 11½ mill. (sine labro).*

1 ♂. Borneo (Whitehead).

Dem *Ther. Hennigi* m. von Assam durch die verbreiterten Fühlerglieder, die Stirnskulptur, Färbung (mit Ausnahme der Fld.) und Fld.-Skulptur auffallend nahe verwandt. Die gelbe Querlinie ist fast gerade und recht schmal, Naht bis zum Schildchen metallisch, der laterale Abhang des postbasilar-Höckers von derselben Färbung. Die untere Grenze der gelben Schulterparthie unregelmäßig gezackt (neben der Naht schiebt sie einen breiten, kurzen, stumpfen Fortsatz nach hinten).

*Cicindela Dormeri.*

*C. Ganglbaueri* m. *affinis*, *differt statura multo minore minusque elongata, oculis magis prominulis; thorace brevior, parallelo (vel basim versus vix angustato), angulis posticis ♀ non productis, ad basim paullulum convexo, superficie subtilissime sat dense transversim plicata vel striolata; elytris brevioribus (♀ angulo humerali fere usque ad maculam primam lucente), apice singulo non rotundato, spina suturali non retracta; metathoracis episternis abdominisque margine minus dense albo-setosis. Colore supra cuprascente, partibus supraorbitalibus cyanescentibus, thoracis basi apiceque viridescentibus; elytrorum marginibus lateralibus apiceque sat late, sutura anguste aureo-viridescentibus paullulum nitentibus (toto disco brunneo-obscuro, opaco, velutino); scutello cyaneo; puncto medio albo elytrorum paullulum oblique sito (intus et apicem versus). — Long.  $7\frac{3}{4}$ — $8\frac{1}{4}$  mill.*

♀♂. Kandy (Ceylon).

Beim ♀ ist das Pronotum auf der Scheibe leuchtend kupferroth, der laterale Rand breit grünlich-golden glänzend, beim ♂ erheblich matter (die Gestalt des Halssch. variirt nach den Geschlechtern kaum, nur ist das ♂ schmaler). Die unregelmäßigen Querfalten auf der Thoraxscheibe von *C. Ganglbaueri*<sup>1)</sup> scheinen sehr zu schwanken und bisweilen durch eine gleichmäßige Querstrichung vertreten zu sein. Die dunkelgrünliche Färbung ist im Gegensatz zu *C. Dormeri* recht auffallend. Beide Arten ♀ haben einen kleinen dunklen Spiegelfleck im vorderen Drittel der Fld. neben der Naht.

Im British Museum sah ich ein paar nahe verwandte, unbeschriebene Ceylon-Species, die besonders in der Form des Thorax und der Fld.-Spitze sich unterschieden. (*C. seriepunctata* m. hat nur eine scheinbar ähnliche Zeichnung!)

1) Das ♂ dieser Art hat einen vom ♀ stark verschiedenen Halssch.-Bau: der Thorax ist lang, schmal, fast parallel, nach hinten kaum merklich verengt. Schulterecke nicht so leuchtend als beim ♀.